

ALGIDOL® 600

IBUPROFENO 600 mg

**ANTIINFLAMATORIO
ANALGÉSICO - ANTIFEBRIL
COMPRIMIDOS REVESTIDOS
V.A.: ORAL**

FORMULA

Cada comprimido revestido contiene:

Ibuprofeno.....600 mg
Excipientes c.s.p.....1 comprimido revestido

ACCION TERAPEUTICA

Antiinflamatorio no esteroideo (AINE) con propiedades analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias.

PROPIEDADES

El Ibuprofeno es un agente antiinflamatorio no esteroideo derivado del ácido fenilpropiónico con acción predominantemente analgésica y antiinflamatoria gracias a que actúa inhibiendo la síntesis de las prostaglandinas responsables del dolor y la inflamación. Por lo cual tiene gran utilidad en el tratamiento de procesos dolorosos de cualquier etiología.

INDICACIONES

Dolor moderado a severo de diversas etiologías. Menstruación dolorosa, agudos y crónicos, síndrome febriles, cefaleas, dolores traumáticos y reumáticos, mialgias, mastoiditis, mastitis, dolores post-partos, dolores post-operatorios. Procesos inflamatorios. Osteoartritis reumatoidea.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la droga, síndrome de pólipos nasales, angioedema o broncoespasmo. Debe utilizarse con prudencia en pacientes con antecedentes de gastritis o úlceras gastroduodenal, hipertensión arterial y/o insuficiencia renal cardiaca.

Tercer trimestre del embarazo (Cat. C). También en sujetos que padecen trastornos de la coagulación o están sometidos a terapia anticoagulante.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Se debe administrar con cuidado en pacientes con hemofilia u otros problemas hemorrágicos, ya que puede aumentar el riesgo de hemorragias por la inhibición de la agregación plaquetaria, puede producir ulceración o hemorragias gastrointestinales. También se pueden observar casos de gastritis, dispepsia, vómitos, diarreas, distensión abdominal, mareos, agranulocitosis, anemia aplásica, sangre oculta en materia fecal.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

El uso simultáneo con paracetamol puede aumentar el riesgo de efectos renales adversos.

La administración junto con corticoides o alcohol aumentan el riesgo de efectos gastrointestinales adversos. El uso simultáneo con hipoglucemiantes orales o insulinas puede aumentar el efecto hipoglucémico de estos. El uso con anticoagulantes orales y heparina puede aumentar el riesgo de hemorragia.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

El Ibuprofeno inhibe a la enzima ciclooxigenasa dando lugar a una disminución en la formación de precursores de las prostaglandinas y de los tromboxanos a partir del ácido araquidónico, inhibe de manera reversible la agregación plaquetaria, pero menos que el ácido acetil salicílico.

La recuperación de la función plaquetaria se produce en el plazo de 24 horas después de suspender el tratamiento.

Se absorbe por vía oral en forma rápida pero los alimentos disminuye la velocidad de absorción. Su unión a las proteínas plasmáticas es muy alta 98% se metaboliza en el hígado. El tiempo hasta alcanzar su efecto máximo es de una a dos horas. Se metaboliza rápidamente y se elimina en la orina 1% libre y 14% conjugado, virtualmente la dosis completa dentro de las 24 horas de ser ingerida.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Administrar con cuidado a pacientes con antecedentes de asma o síndromes de poliposis nasal. Tener especial precaución en pacientes con hipertensión arterial que utilizan diuréticos: En algunos pacientes el Ibuprofeno puede reducir el efecto natriurético de la furosemida y de las tiazidas. Su uso en presencia de úlcera péptica, colitis ulcerosa o enfermedad del tracto gastrointestinal superior activa puede aumentar el riesgo de efectos secundarios gastrointestinales o de efectos ulcerogénicos. Los pacientes geriátricos son más propensos a desarrollar toxicidad gastrointestinal hepática y renal.

RESTRICCIONES DE USO

No administrar en pacientes alérgicos al Ibuprofeno. No administrar en presencia de gastritis y úlcera gastroduodenal activa y en cuadros asmáticos. No administrar en niños menores de 6 meses.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

Como dosis de ataque se puede iniciar el tratamiento con dos comprimidos de entrada (800 a 1200 mg) y luego un comprimido vía oral cada 4 a 8 horas.

La prescripción usual límite es de 3.200 mg/día.

Para control de dolores leves a moderados las dosis puede ir de tres a cuatro veces por día hasta controlar el dolor de la enfermedad.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o intoxicación, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION

Caja conteniendo 10 comprimidos revestidos.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. N° 13302-02-EF

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. N° 2337

Venta bajo receta

Industria Paraguaya



IMEG

Elaborado por GUAYAKI S.A.
para su División IMEG

Ofic. Administ.: Av. Brasilia N° 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay