

# Micofinal®

## CLOTRIMAZOL 100 mg

**ANTIMICOTICO - FUNGICIDA - ANTIBACTERIANO  
OVULOS VAGINALES  
V.A.: VAGINAL**

### FORMULA

Cada óvulo vaginal contiene:

Clotrimazol.....100 mg  
Excipientes c.s.p.....1 óvulo vaginal

### ACCION TERAPEUTICA

Antimicótico, fungicida, antibacteriano.

### PROPIEDADES

El Clotrimazol, posee una acción antimicótica y fungicida, sobre distintas especies de hongos de los géneros trichophyton, microsporium, cándidas; que son los productores más frecuentes de micosis superficiales, así también esta acción la ejerce sobre los hongos no patógenos.

Tiene acción antibacteriana sobre los estafilococos y estreptococos. Actúa también sobre los protozoarios: trichomona vaginalis, corinebacterium cutáneo y contra la ameba naegleria fowleri.

### INDICACIONES

Indicado para vaginitis, vulvovaginitis, vulvitis candidiásicas y tricomoníasis.

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad al clotrimazol o a otros antimicóticos imidazólicos.

### REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

En raros casos podrá presentarse desarrollo de irritación y/o sensibilización, por lo que en estos casos se deberá suspender el tratamiento y aplicar las medidas correctivas necesarias.

### INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

Está contraindicado su uso con anticoagulantes, pues el clotrimazol potencia el efecto de los mismos.

El clotrimazol en raras ocasiones puede reducir la efectividad y seguridad de los productos de látex, (por ejemplo: condones y diafragma) al igual que espermicidas vaginales, sin embargo este efecto es temporal y se presenta solo durante el tratamiento.

### MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

El Clotrimazol su mecanismo de acción la ejerce sobre la membrana celular de los hongos, de manera a aumentar la permeabilidad, lo que lleva a la pérdida de elementos celulares, indispensables para el crecimiento y la vida celular.

La absorción es buena por la mucosa vaginal. La porción absorbida sufre una biotransformación en el organismo, se excreta por la orina y las heces.

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Estudios clínicos no han dado ningún indicio que con la aplicación del clotrimazol durante el embarazo pueden observarse efectos dañinos para la madre o el feto. Sin embargo durante el primer trimestre del embarazo como todos los medicamentos el uso del clotrimazol queda bajo responsabilidad del médico tratante.

### RESTRICCIONES DE USO

Generalmente es bien tolerado, en pacientes sensibles puede producir ardor y prurito, que son de carácter leve a moderado y ceden con la suspensión del tratamiento.

### POSOLOGIA Y MODO DE USO

1 óvulo vaginal a la noche durante 8 a 10 días.

Si hay una micosis comprobada, 3 semanas de tratamiento previenen el riesgo de recaídas.

Para garantizar la eficacia del tratamiento se recomienda:

a) Efectuar el tratamiento durante los días sin menstruación.

b) En caso de balanitis de la pareja este se puede aplicar Micofinal Crema durante 2 semanas.

c) Efectuar el tratamiento sin intercurso de vida sexual activa.

### SOBREDOSIS

En caso de sobredosis, malestar o intoxicación accidental, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

### PRESENTACION

Caja conteniendo 10 óvulos vaginales.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. N° 10515-03-EF

Conservar en la heladera entre 2° y 8°C.

Mantener fuera del alcance de los niños

**Regente:** Q. F. Lina Laratro - Reg. N° 2337

**Venta bajo receta**

Industria Paraguaya



**IMEG**

Elaborado por GUAYAKI S.A.  
para su División IMEG

**Ofic. Administ.:** Av. Brasilia N° 1895  
Tel.: 291-339

**Planta Industrial:** Futsal 88 N° 2416  
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay