

Analgesin®

Dipirona 300 mg

ANALGESICO - ANTIPIRETICO SUPOSITORIO INFANTIL V.A.: RECTAL

FORMULA

Cada supositorio contiene:

Dipirona.....300 mg
Excipientes c.s.p.....1 supositorio

ACCION TERAPEUTICA

Analgésico - Antipirético.

PROPIEDADES

La Dipirona es un derivado pirazolónico, es el sulfonato de sodio de la amidopirina. Actúa también como inhibidor selectivo de las prostaglandinas F2 ALFA. Actúa principalmente como analgésico y antipirético con una leve acción relajante del músculo liso.

INDICACIONES

Fiebres de cualquier etiologías. Dolores ulteriores a intervenciones quirúrgicas, espasmos del aparato gastrointestinal.

CONTRAINDICACIONES

Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad a las pirazononas y en presencia de determinadas enfermedades metabólicas (porfiria, déficit congénito de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa).

En pacientes que reciben otros AINES.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES

Su uso puede producir erupciones cutáneas. Anemias, agranulocitosis. Leucopenia, trombocitopenia.

También puede producir irritación local.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

A dosis elevadas aumenta la acción depresora del S.N.C. y reduce la acción de la ciclosporina.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA

La Dipirona actúa a nivel central y periférico. Inhibe los ácidos grasos insaturados precursores de las prostaglandinas PGE1, PGE2 y PGF2a principales de la inflamación y el dolor.

El efecto antitérmico se debe por la acción sobre los termorreguladores hipotalámicos. Se absorbe perfectamente por vía rectal. Se combina con las proteínas plasmáticas distribuyéndose en todos los tejidos y líquidos del organismo. Su vida media es de 7 horas y se excreta por vía urinaria.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

No administrar en pacientes tratados con anticoagulantes. Pacientes con hipersensibilidad al fármaco.

Evitar su uso cuando el paciente recibe Dipirona concomitantemente por vía oral.

RESTRICCIONES DE USO

No utilizar en niños con hipersensibilidad a la Dipirona y que presenten cuadro de diarrea.

POSOLOGIA Y MODO DE USO

Salvo prescripción médica.
1 supositorio cada 6 u 8 horas.

SOBREDOSIS

Síntomas y signos de sobredosis: síntomas de irritación gastrointestinal (epigastralgia, cólicos abdominales excesiva. Más tardíamente pueden observarse signos de encefalopatía hepática (4 a 6 días después de la ingestión) e insuficiencia hepática de magnitud variable.

Tratamiento inicial (inepecífico): Si la ingesta es reciente y no existen contraindicaciones, eliminar el medicamento que pueda estar aún en el estómago, mediante lavado gástrico o vómito inducido. Administrar luego carbón activado.

Ante cualquier sobredosis accidental, llamar al centro de toxicología de Emergencias Medicas Telf. 220418/9.

PRESENTACION

Caja conteniendo 6 supositorios.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. N° 10632-03-EF

Conservar en la heladera entre 2° y 8°C.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. N° 2337

Venta Bajo Receta

Industria Paraguaya



Elaborado por GUAYAKI S.A.
División Salud Humana



Ofic. Administr.: Av. Brasilía N° 1895

Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay