

Anginomeg®

NEOMICINA - BACITRACINA
BENZOCAÍNA

ANTIBIÓTICO - ANTISÉPTICO
ANTIMICROBIANO BUCOFARÍNGEO

SOLUCIÓN SPRAY BUCAL
V.A.: Oral

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Neomicina sulfato.....	500 mg
Bacitracina de Zinc.....	20 mg
Benzoína HCL.....	250 mg
Excipientes.....	c.s.p 100 mL

ACCIÓN TERAPEÚTICA

Antibiótico, Antiséptico, antimicrobiano bucofaríngeo.

PROPIEDADES

ANGINOMEG SPRAY, reúne en su fórmula principios activos de acciones antiinflamatoria, analgésica y antibiótica. Se presenta en forma de spray, con válvula dosificadora, por lo cual es adecuado en la terapia preventiva y curativa de las afecciones bucofaríngeas.

INDICACIONES

Tratamiento preventivo-curativo de las afecciones bucofaríngeas:

Amigdalitis, Faringitis, Laringitis, Estomatitis, Úlceras y Aftas bucales, Glositis.

Odontología: queilitis, gingivitis, periodontitis, pericoronitis, mucositis e inflamación de la mucosa bucal posterior a cirugía dental, prótesis dentales, ortodoncia y exodoncia.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a la asociación o algún componente de la fórmula.

REACCIONES ADVERSAS, EFECTOS COLATERALES

Irritación de garganta, ronquera, tos. En personas susceptibles, puede presentarse adormecimiento pasajero de la boca. En caso de ingestión accidental, no se han reportado eventos secundarios adversos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

No se han descrito interacciones medicamentosas o de otro género. Alteraciones en los resultados de pruebas de laboratorio: No se han reportado.

MECANISMO DE ACCIÓN Y FARMACOCINÉTICA

ANGINOMEG SPRAY, es una solución con rápida acción antiinflamatoria, analgésica y anestésica, indicada para aliviar las molestias de boca y faringe. Actúa contra los mecanismos básicos comunes de la inflamación, **ANGINOMEG SPRAY**, controla la permeabilidad vascular y estabiliza las membranas celulares. Combate las manifestaciones hemáticas y vasculares de la inflamación como rubor, calor y edema, inhibe selectivamente a las prostaglandinas involucradas en la inflamación. Posee efectos analgésicos y anestésicos locales, independientes uno del otro, que permiten controlar rápidamente el dolor de las afecciones inflamatorias estomatológicas y bucofaríngeas. Además **ANGINOMEG SPRAY**, tiene capacidad de reducir la hiperemia local provocada por la inflamación de la mucosa bucal y faríngea. Posee una acción antiséptica sobre diversos hongos y bacterias. Por su actividad histoprotectora, aumenta la resistencia del epitelio bucofaríngeo hacia los agentes patógenos.

ANGINOMEG SPRAY, es un medicamento de aplicación tópica, por lo que la absorción sistémica es prácticamente nula; la concentración sérica que se obtiene es mínima (0,035 mcg/ml) y se elimina por vía urinaria.

La neomicina es bactericida y actúa inhibiendo la síntesis de proteínas en las células bacterianas sensibles. Es eficaz sobre todo contra bacilos gram-negativos, pero también tiene alguna actividad contra organismos gram-positivos. El mecanismo de acción consiste en la unión irreversible del antibiótico al segmento 30S del ribosoma, por lo que da un resultado biocida. No disminuye su eficacia en presencia de pus.

La bacitracina es un antibiótico que se indica en contra de bacterias gram positivas, especialmente en heridas y mucosas, porque inhibe la formación de la pared celular de estos microorganismos.

La bacitracina se absorbe pobremente, la aplicación tópica causa actividad antibacteriana sin toxicidad sistémica de importancia. Las mínimas concentraciones absorbidas con el uso tópico se excretan por los riñones.

La bacitracina interfiere con la desfosforilación del C55-fosfato de isoprenil.

La benzoína es un anestésico local, que actúa bloqueando la iniciación y conducción del impulso nervioso por disminución de la permeabilidad de la membrana neuronal de iones sodio.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Precauciones generales: El producto está indicado para uso tópico bucal. Evítese su ingestión. El uso del producto en niños menores de 7 años debe ser supervisado por un adulto.

Embarazo y lactancia: Durante el embarazo o la lactancia, consulte a su médico antes de usar este medicamento.

RESTRICCIONES DE USO

Personas alérgicas a los principios activos o a sus asociaciones.

POSOLOGÍA Y MODO DE USO

Uso bucofaríngeo

Dosis de ataque: 1-2 aplicaciones cada 2-3 horas.

Dosis de sostén o como preventivo: 1 aplicación cada 6 horas.

Normas para la correcta administración del preparado:

Abrir bien la boca. Dirigir la boquilla inhaladora hacia la región afectada (garganta, boca, lengua, etc., según casos). Presionar la parte superior de la cápsula de arriba a abajo hasta el tope, manteniendo el frasco en posición vertical. El frasco se halla provisto de una válvula dosificadora: cada presión hasta el tope origina la salida regulada de medicamentos.

SOBREDOSIS

En caso de sobredosis o intoxicación accidental, llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION

Caja conteniendo 1 frasco x 30 mL con aplicador bucal.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. Nº

Conservar a temperatura ambiente inferior a 30°C

Mantener fuera del alcance de los niños

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta

Industria Paraguaya



Elaborado por GUAYAKI S.A.
para su División IMEG

Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895

Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 Nº 2416

Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay