Videmina 800®

Aciclovir 800 mg

ANTIVIRAL

COMPRIMIDOS - V.A.: ORAL

FORMULA
Cada comprimido contiene:
Aciclovir.....800 mg
Excipientes c.s.p.....1 comprimido

ACCION TERAPEUTICA
Antiviral.

PROPIEDADES
Actúa contra los tipos I y II de herpes simple y virus de varicela zoster, con baja toxicidad para las células infectadas del hombre.

INDICACIONES
Videmina 800 está indicado en el herpes zoster y el herpes genital recurrente. Profilaxis del paciente inmunocomprometidos.

CONTRAINDICACIONES
Pacientes que hayan demostrado ser hipersensibles al aciclovir. Deberá evaluarse la relación riesgo-beneficio en pacientes con disfunción renal preexistente, hepática o anomalías neurológicas.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Droga bien tolerada en tratamientos cortos. Puede producir, náuseas, vómitos, diarreas, cefálea y aumento de creatininemia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
El Probenecid aumenta la vida media y las concentraciones plasmáticas de aciclovir.
Otras drogas que afecten la fisiología renal podrán influir potencialmente en la farmacocinética del aciclovir.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
El Aciclovir, cuando penetra en la célula infectada por el virus herpes se fosforila convirtiéndose en el compuesto activo aciclovir-trifosfato. Para este primer paso se requiere la presencia de la timidinacinasa específica del virus del herpes simple. El aciclovir-trifosfato actúa como inhibidor específico del DNA polimerasa del virus herpes, evitando la posterior síntesis del DNA viral sin afectar los procesos celulares normales.
En los adultos la vida media plasmática del aciclovir, después de su administración, es de unas 2 a 9 horas. La mayor parte de la droga se excreta sin cambios por el riñón.
Tanto la secreción tubular como la filtración glomerular contribuyen a la eliminación renal. También se elimina mediante la hemodiálisis.Se absorbe poco en el tracto gastrointestinal (15 a 30%), aunque las concentraciones séricas son suficientes para obtener un efecto terapéutico. Se distribuye ampliamente en los tejidos y líquidos corporales, encontrándose las mayores concentraciones en el riñón, hígado e intestino. Las concentraciones en el LCR son aproximadamente 50% de las concentraciones plasmáticas. Atraviesa la placenta y su unión a las proteínas es baja.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Deberá utilizarse con precaución en pacientes con alteraciones renales, a fin de evitar acumulación de la droga, se regulará la dosis en función de la tabla de posología. Vigilar la función renal en pacientes sometidos a trasplantes renales, por el aumento que produce de la creatinina o urea sérica.

Se deberá indicar en mujeres embarazadas sólo cuando la valoración riesgo-beneficio de su aplicación aconseje su uso. Las mujeres con herpes genital son más propensas a desarrollar cáncer cervical, por lo que es necesario realizar un frotis para Papanicolaou anualmente o con mayor frecuencia.

RESTRICCIONES DE USO
Insuficiencia hepática y renal severa.

SOBREDOSIS
El Aciclovir es una droga poco toxica que en dosis mayores puede producir náuseas, vómitos, diarrea, temblores, y mareos que desaparecen al disminuir la dosis. Ante cualquier sobredosis accidental llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Tel.: 220 418/9.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
Herpes zoster agudo en adultos no inmunocomprometidos, 800 mg cada 4 horas, 5 veces en el día (4 g diarios por un período de 7 a 10 días), en supresión del herpes genital un comprimido una vez al día, durante uno a dos meses. Discontinuar la terapia a intervalos de 6 a 12 meses para evaluar cualquier cambio del curso de la enfermedad.

PRESENTACIONES
Caja conteniendo 25 comprimidos.
Hospitalar: 100 blisters x 5 comprimidos.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 14502-02-EF

Conservar a temperatura inferior a 30ºC
Mantener fuera del alcance de los niños
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta Industria Paraguaya

Guayaki® división Salud Humana

Elaborado por GUAYAKI S.A.
División Salud Humana

Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339
Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822
Asunción - Paraguay

Grafigraf Tel.: 555 915

Videmina 800®

Aciclovir 800 mg

ANTIVIRAL

COMPRIMIDOS - V.A.: ORAL

FORMULA
Cada comprimido contiene:
Aciclovir.....800 mg
Excipientes c.s.p.....1 comprimido

ACCION TERAPEUTICA
Antiviral.

PROPIEDADES
Actúa contra los tipos I y II de herpes simple y virus de varicela zoster, con baja toxicidad para las células infectadas del hombre.

INDICACIONES
Videmina 800 está indicado en el herpes zoster y el herpes genital recurrente. Profilaxis del paciente inmunocomprometidos.

CONTRAINDICACIONES
Pacientes que hayan demostrado ser hipersensibles al aciclovir. Deberá evaluarse la relación riesgo-beneficio en pacientes con disfunción renal preexistente, hepática o anomalías neurológicas.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Droga bien tolerada en tratamientos cortos. Puede producir, náuseas, vómitos, diarreas, cefálea y aumento de creatininemia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
El Probenecid aumenta la vida media y las concentraciones plasmáticas de aciclovir.
Otras drogas que afecten la fisiología renal podrán influir potencialmente en la farmacocinética del aciclovir.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
El Aciclovir, cuando penetra en la célula infectada por el virus herpes se fosforila convirtiéndose en el compuesto activo aciclovir-trifosfato. Para este primer paso se requiere la presencia de la timidinacinasa específica del virus del herpes simple. El aciclovir-trifosfato actúa como inhibidor específico del DNA polimerasa del virus herpes, evitando la posterior síntesis del DNA viral sin afectar los procesos celulares normales.
En los adultos la vida media plasmática del aciclovir, después de su administración, es de unas 2 a 9 horas. La mayor parte de la droga se excreta sin cambios por el riñón.
Tanto la secreción tubular como la filtración glomerular contribuyen a la eliminación renal. También se elimina mediante la hemodiálisis.Se absorbe poco en el tracto gastrointestinal (15 a 30%), aunque las concentraciones séricas son suficientes para obtener un efecto terapéutico. Se distribuye ampliamente en los tejidos y líquidos corporales, encontrándose las mayores concentraciones en el riñón, hígado e intestino. Las concentraciones en el LCR son aproximadamente 50% de las concentraciones plasmáticas. Atraviesa la placenta y su unión a las proteínas es baja.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Deberá utilizarse con precaución en pacientes con alteraciones renales, a fin de evitar acumulación de la droga, se regulará la dosis en función de la tabla de posología. Vigilar la función renal en pacientes sometidos a trasplantes renales, por el aumento que produce de la creatinina o urea sérica.

Se deberá indicar en mujeres embarazadas sólo cuando la valoración riesgo-beneficio de su aplicación aconseje su uso. Las mujeres con herpes genital son más propensas a desarrollar cáncer cervical, por lo que es necesario realizar un frotis para Papanicolaou anualmente o con mayor frecuencia.

RESTRICCIONES DE USO
Insuficiencia hepática y renal severa.

SOBREDOSIS
El Aciclovir es una droga poco toxica que en dosis mayores puede producir náuseas, vómitos, diarrea, temblores, y mareos que desaparecen al disminuir la dosis. Ante cualquier sobredosis accidental llamar al Centro de Toxicología de Emergencias Médicas. Tel.: 220 418/9.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
Herpes zoster agudo en adultos no inmunocomprometidos, 800 mg cada 4 horas, 5 veces en el día (4 g diarios por un período de 7 a 10 días), en supresión del herpes genital un comprimido una vez al día, durante uno a dos meses. Discontinuar la terapia a intervalos de 6 a 12 meses para evaluar cualquier cambio del curso de la enfermedad.

PRESENTACIONES
Caja conteniendo 25 comprimidos.
Hospitalar: 100 blisters x 5 comprimidos.

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 14502-02-EF

Conservar a temperatura inferior a 30ºC
Mantener fuera del alcance de los niños
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta Industria Paraguaya

Guayaki® división Salud Humana

Elaborado por GUAYAKI S.A.
División Salud Humana

Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339
Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822
Asunción - Paraguay

Grafigraf Tel.: 555 915